

Entericolix

инжекционна емулсия за прасета

Една доза (2 ml) от инактивираната ваксина съдържа:

Активни субстанции: *Escherichia coli* щам P4 (F6 адхезини) ≥ 1 RP*, *Escherichia coli* щам P5 (F18ab адхезини) ≥ 1 RP*, *Escherichia coli* щам P6 (F4ac адхезини) ≥ 1 RP*, *Escherichia coli* щам P9 (F18ac адхезини) ≥ 1 RP*, *Escherichia coli* щам P10 (F5 + F41 адхезини) ≥ 1 RP*, бета токсин на *Clostridium perfringens* тип C (CZV13) ≥ 10 IU** от β антитоксин/ml заешки серум.

Терапевтични показания: Ваксинация на свине-майки и млади свине за разплод за пасивна имунизация на прасенцата срещу колибацилоза, причинена от ентеропатогенни и ентеротоксигенни *E. coli* щамове, експресиращи F4ac, F5, F6, F18ac и F41 адхезини, срещу едемна болест, причинена от *E. coli* щамове, експресиращи F18ab адхезин и срещу некротичен ентерит, причинен от *C. perfringens* тип C, както следва: Новородени прасенца: Ваксината намалява смъртността и клиничните признаци (тежка диария), дължащи се на колибацилоза; Ваксината намалява смъртността и клиничните признаци, дължащи се на некротичен ентерит, причинен от *C. perfringens* тип C. Отбити прасенца: Ваксината намалява смъртността и клиничните признаци, дължащи се на едемна болест; Ваксината намалява клиничните признаци (тежка диария) на колибацилоза; Ваксината намалява клиничните признаци на хроничен ентерит, дължащ се на *C. perfringens* тип C.

Продължителност на имунитета: 21 дни за инфекции, причинени от F4ac, F18ac (колибацилоза) и *Clostridium perfringens* тип C (некротичен ентерит); 21 дни за антителата срещу F5, F6 и F41, но ефикасността на защита на нивата на антителата не е установена; 28 дни за инфекции, причинени от F18ab (едемна болест).

Видове животни, за които е предназначен ВМП: Прасета (свине-майки и млади свине за разплод. Бременност и лактация: Може да се прилага по време на бременност. Ваксината не трябва да се прилага през 4-седмичния период преди очакваната дата на опорасване.

Фармакотерапевтична група: Инактивирани бактериални ваксини срещу *Escherichia coli* и *Clostridium perfringens*. Ветеринарномедицински Анатомио-Терапевтичен Код: QI09AB08 Ваксината съдържа инактивирани щамове от *Escherichia coli*, експресиращи адхезините F4ac, F5, F6, F18 ab, F18ac и F41, които причиняват неонатална ентеротоксикоза при прасенцата, а така също и β -ентеротоксин от *Clostridium perfringens* тип C. Ваксината съдържа маслен аджувант. При свине-майки и млади свине за разплод ваксината индуцира специфичната сероконверсия на ваксинираните животни; прасенцата са пасивно имунизирани от приема на коластра, съдържаща адхезин-специфични антитела срещу *Escherichia coli* и антитела срещу ентеротоксините на *Clostridium perfringens*.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.